



# REPORT ESTESO ISS

COVID-19: SORVEGLIANZA, IMPATTO DELLE  
INFEZIONI ED EFFICACIA VACCINALE

Aggiornamento nazionale  
16/03/2022 – ore 12:00

DATA PUBBLICAZIONE: 18/03/2022

**Versione 2** del **19/3/2022**: correzione refuso pag. 4

*Questo report è prodotto dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e riporta i dati della sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus SARS-CoV-2 segnalati sul territorio nazionale, coordinata dall'ISS ai sensi dell'Ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020. Le informazioni contenute derivano da tutti i casi di infezione da virus SARS-CoV-2 che sono stati confermati tramite test molecolari e antigenici dalle Regioni e Province Autonome e segnalati al sistema di sorveglianza attraverso una piattaforma web dedicata. Il database nazionale si compone, pertanto, della somma dei casi presenti nei 21 sistemi informativi di Regioni e PPAA che sono stati sviluppati ad hoc per la sorveglianza COVID-19.*

*Si specifica che la definizione di caso di Covid-19 è quella riportata all'interno della circolare del Ministero della Salute n.705 dell'8 gennaio 2021. Si sottolinea inoltre, in coerenza con il dettato normativo, che, in assenza di test molecolare e/o antigenico con risultato positivo, non vengono inclusi i casi di pregressa infezione rilevati esclusivamente a posteriori attraverso un test sierologico positivo.*

*All'interno del presente report viene descritta, con l'ausilio di grafici, mappe e tabelle, la diffusione nel tempo e nello spazio dell'epidemia di COVID-19 in Italia, con un ulteriore livello di dettaglio che tiene conto della descrizione delle caratteristiche dei casi segnalati.*

*Il formato del report è di tipo dinamico, in coerenza con il fenomeno che descrive, mutevole per sua natura, e con l'evoluzione della pandemia legata all'emergenza sanitaria che ha interessato il nostro Paese. Per questo motivo è stato soggetto a variazioni nel corso del tempo, finalizzate ad un miglioramento nella sua leggibilità e nella completezza delle informazioni fornite.*

*Il presente report, nella sua forma attuale, è una nuova versione, realizzata in maniera semi-automatizzata attraverso l'implementazione di script che elaborano i dati provenienti dal sistema di sorveglianza integrato Covid-19 e che producono le rappresentazioni in forma grafica e tabellare.*

### Andamento e impatto dell'epidemia:

- Dall'inizio dell'epidemia alle ore 12 del 16 marzo 2022 sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 **13.428.135** casi, di cui **154.954 deceduti**.
- Dall'ultima indagine rapida sulla prevalenza e distribuzione delle varianti di SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia, condotta dall'ISS e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, è emerso che in Italia il 17 marzo 2022 la variante Omicron era predominante, con una prevalenza stimata del 99,86%. Il lignaggio BA.2 ha una prevalenza del 44,07% e il BA.1 risulta ancora il più frequente con il 55,78% di prevalenza (<https://www.iss.it/cov19-cosa-fa-iss-varianti>).
- Nel corso dell'ultima settimana si è registrato un aumento del numero dei casi segnalati, ma il numero delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva continua a diminuire. In diminuzione anche il numero settimanale di decessi.
- Stabile rispetto alla precedente settimana la percentuale di casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione (2,6%).
- Nell'ultima settimana il tasso di incidenza a 7 gg risulta compreso fra 250 e 1.000 casi per 100.000 abitanti in tutte le fasce d'età. Il tasso di incidenza a 7 gg dei ricoveri risulta in diminuzione in tutte le fasce di età ad esclusione della fascia 0-9, 20-29 e 30-39 anni.
- Stabile la percentuale di casi segnalati con stato clinico iniziale asintomatico, pari circa al 69%.

### Infezioni da virus SARS-CoV-2 nelle ultime due settimane: dal 28 febbraio al 13 marzo 2022

- Durante il periodo di riferimento sono stati diagnosticati e segnalati 603.053 nuovi casi, di cui 413 deceduti (tale valore non include le persone decedute nel periodo con una diagnosi antecedente al 28 febbraio 2022). Anche in quest'ultima settimana, il numero di casi notificati dalla regione Sicilia risente del **ritardo di notifica** dovuto a difficoltà tecnico-organizzative e alla forte pressione sui servizi sanitari.
- **A livello nazionale aumenta l'incidenza settimanale:** I dati del flusso ISS nel periodo 7/3/2022 – 13/3/2022 evidenziano un aumento dell'incidenza, pari a 576 per 100.000 abitanti, rispetto a 429 per 100.000 abitanti della settimana precedente (28/2/2022 – 6/3/2022). Questa tendenza trova conferma anche nei dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute (725 per 100.000 abitanti nel periodo 11-17/03/2022 vs 510 per 100.000 nel periodo 4-10/03/2022, dati flusso dati aggregati Ministero della Salute).

- Nella fascia 10-19 anni si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 1.695 per 100.000, mentre nella fascia di età 70-79 anni si registra il valore più basso, 556 casi per 100.000 abitanti. In aumento l'incidenza a 14 giorni nelle fasce 10-19, 20-29, 50-59, 60-69 e 70-79 anni.
- L'età mediana dei soggetti segnalati negli ultimi 14 giorni è pari a 38 anni, stabile rispetto alle scorse settimane.

### Trasmissibilità del virus SARS-CoV-2:

- I valori di Rt sono i seguenti:
  - Rt sintomi = **0,87** (IC95%: **0,87-0,88**) al 2 marzo 2022 in aumento rispetto alla settimana precedente (**0,86** al 23 febbraio 2022)
  - Rt ospedalizzazioni = **0,9** (IC95%: **0,88-0,93**) al 8 marzo 2022 in aumento rispetto alla settimana precedente (**0,82** al 1 marzo 2022)
  - Rt augmented = **1,24** (IC95%: **1,23-1,24**) al 8 marzo 2022 in aumento rispetto alla settimana precedente (**0,95** al 1 marzo 2022).

### Focus età scolare (0-19 anni):

- Dall'inizio dell'epidemia alle ore 12 del 16 marzo 2022 sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 **3.072.520 casi nella popolazione 0-19 anni**, di cui **15.532 ospedalizzati**, **355 ricoverati in terapia intensiva** e **50 deceduti**.
- In leggera diminuzione da circa tre settimane la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare (26%) rispetto al resto della popolazione. Nell'ultima settimana il 15% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 39% nella fascia d'età 5-11 anni, il 46% nella fascia 12-19 anni.
- In leggero aumento il tasso di incidenza in tutte le fasce d'età. Stabile il tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d'età ad eccezione della fascia <5 anni in cui risulta in aumento, benché i dati riferiti all'ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento.

### Reinfezioni da virus SARS-CoV-2:

- Dal 24 agosto 2021 al 16 marzo 2022 sono stati segnalati **264.634 casi di reinfezione**, pari a 3% del totale dei casi notificati. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati è pari a 3,2%, stabile rispetto alla settimana precedente.
- L'analisi del rischio di reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021 (data considerata di riferimento per l'inizio della diffusione della variante Omicron), **evidenzia un aumento del rischio relativo aggiustato di reinfezione** (valori significativamente maggiori di 1):
  - nei soggetti con prima diagnosi di COVID-19 notificata da oltre 210 giorni rispetto a chi ha avuto la prima diagnosi di COVID-19 fra i 90 e i 210 giorni precedenti;


- nei soggetti non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni rispetto ai vaccinati con almeno una dose entro i 120 giorni;
- nelle femmine rispetto ai maschi. Il maggior rischio nei soggetti di sesso femminile può essere verosimilmente dovuto alla maggior presenza di donne in ambito scolastico (>80%) dove viene effettuata una intensa attività di screening e al fatto che le donne svolgono più spesso la funzione di caregiver in ambito familiare;
- nelle fasce di età più giovani (dai 12 ai 49 anni) rispetto alle persone con prima diagnosi in età compresa fra i 50-59 anni. Verosimilmente il maggior rischio di reinfezione nelle fasce di età più giovani è attribuibile a comportamenti ed esposizioni a maggior rischio, rispetto alle fasce d'età > 60 anni;
- negli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione.

### **Impatto della vaccinazione nel prevenire infezioni, ricoveri e decessi:**

- La campagna vaccinale in Italia è iniziata il 27 dicembre 2020. Al 16 marzo 2022, sono state somministrate 135.216.610 dosi (47.268.200 prime dosi, 49.638.960 seconde/uniche dosi e 38.309.450 terze dosi; <https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini>).
- Nella fascia 5-11 anni, in cui la vaccinazione è iniziata il 16 dicembre 2021, al 16 marzo 2022 si registra una copertura con una dose pari a 4,1% e con due dosi pari a 32,3%.
- Il tasso di ospedalizzazione standardizzato per età, relativo alla popolazione di età  $\geq 12$  anni, nel periodo 28/1/2022-27/02/2022 per i non vaccinati (222 ricoveri per 100.000 ab.) risulta circa tre volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da  $\leq 120$  giorni (65 ricoveri per 100.000 ab.) e circa otto volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (27 ricoveri per 100.000 ab.).
- Il tasso di ricoveri in terapia intensiva standardizzato per età, relativo alla popolazione di età  $\geq 12$  anni, nel periodo 28/1/2022-27/02/2022 per i non vaccinati (16 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.) risulta circa quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da  $\leq 120$  giorni (4 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.) e circa tredici volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (1 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.).
- Il tasso di mortalità standardizzato per età, relativo alla popolazione di età  $\geq 12$  anni, nel periodo 21/01/2022-20/02/2022, per i non vaccinati (83 decessi per 100.000 ab.) risulta circa cinque volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da  $\leq 120$  giorni (18 decessi per 100.000 ab.) e circa quindici volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (6 decessi per 100.000 ab.).
- L'efficacia del vaccino (riduzione percentuale del rischio nei vaccinati rispetto ai non vaccinati) nel periodo di prevalenza Omicron (a partire dal 3 gennaio 2022) nel:


- **prevenire la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 è:**
  - o pari al 52% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 43% tra i 91 e 120 giorni, e 48% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale
  - o pari al 72% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster
  
- **prevenire casi di malattia severa è:**
  - o pari a 73% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 76% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e 76% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni.
  - o pari al 92% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.
  
- Le stime di efficacia del vaccino attualmente escludono dalla popolazione suscettibile i soggetti con pregressa diagnosi nei 90 giorni precedenti, tempo dopo il quale si è nuovamente a rischio di infezione come da definizione di reinfezione (vedi Glossario). Si evidenzia inoltre, dati gli attuali alti livelli di copertura vaccinale, che le stime di efficacia potrebbero risentire di uno sbilanciamento nella distribuzione della popolazione fra vaccinati e non vaccinati. Quest'ultimi rappresentano una fetta molto piccola della popolazione, caratterizzata verosimilmente da fattori di rischio differenti per i quali non è possibile aggiustare all'interno dei modelli per mancanza di adeguate informazioni a livello individuale (es: aspetti socio-comportamentali).

## Andamento e impatto dell'epidemia in Italia




**FIGURA 1 - CASI SETTIMANALI DI COVID-19 SEGNALATI IN ITALIA PER DATA PRELIEVO/DIAGNOSI (A SINISTRA) E NUMERO DI TAMPONI SETTIMANALI EFFETTUATI (A DESTRA)**

Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è consolidato e verosimilmente sottostimato (vedi Nota metodologica: paragrafo 1)



**FIGURA 2 - TREND DEL TASSO DI INCIDENZA SETTIMANALE DI CASI DI COVID-19 SEGNALATI PER 100.000 ABITANTI PER AREA GEOGRAFICA DALL'INIZIO DELL'EPIDEMIA**

Nota: All'interno dell'area grigia il dato deve essere considerato provvisorio (vedi Nota metodologica: paragrafo 1)




**FIGURA 3 - CONFRONTO PER SETTIMANA DI CALENDARIO DEL NUMERO DI TAMPONI, CASI SEGNALATI DI COVID-19, OSPEDALIZZAZIONI, RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA E DECESSI – OTTOBRE 2020 – MARZO 2021 E OTTOBRE 2021 AD OGGI**

Nota: -I dati relativi al numero dei tamponi sono forniti da Mds/PC -I dati dei diversi esiti sono limitati ad alcune settimane precedenti alla data di riferimento del presente bollettino (vedi dettaglio in Nota metodologica: paragrafo 1).

**TABELLA 1 - DISTRIBUZIONE DEI CASI E DEI DECESSI PER COVID-19 SEGNALATI IN ITALIA PER FASCIA DI ETÀ E SESSO DA INIZIO EPIDEMIA**


Class e di età (in anni)	Soggetti di sesso maschile					Soggetti di sesso femminile					Casi totali				
	N. casi	% cas i	N. decedut i	% del totale decedut i	Letalit à %	N. casi	% cas i	N. decedut i	% del totale decedut i	Letalit à %	N. casi	% cas i	N. decedut i	% del totale decedut i	Letalit à %
0-9	666.419	10,3	10	0,0	<0.1	617.525	8,9	12	0,0	<0.1	1.283.944	9,6	22	0,0	<0.1
10-19	909.147	14,1	15	0,0	<0.1	879.429	12,6	13	0,0	<0.1	1.788.576	13,3	28	0,0	<0.1
20-29	842.223	13,1	73	0,1	<0.1	865.645	12,4	38	0,1	<0.1	1.707.872	12,7	111	0,1	<0.1
30-39	858.220	13,3	244	0,3	<0.1	991.622	14,2	141	0,2	<0.1	1.849.846	13,8	385	0,2	<0.1
40-49	1.018.447	15,8	1.011	1,2	0,1	1.192.844	17,1	472	0,7	<0.1	2.211.292	16,5	1.483	1,0	0,1
50-59	965.388	15,0	4.059	4,7	0,4	1.049.463	15,0	1.667	2,5	0,2	2.014.853	15,0	5.726	3,7	0,3
60-69	577.181	8,9	11.413	13,1	2,0	594.011	8,5	4.591	6,8	0,8	1.171.193	8,7	16.004	10,3	1,4
70-79	375.177	5,8	25.813	29,6	6,9	387.635	5,6	12.819	18,9	3,3	762.812	5,7	38.632	24,9	5,1
80-89	201.311	3,1	33.608	38,6	16,7	282.745	4,1	28.461	41,9	10,1	484.063	3,6	62.069	40,1	12,8
>90	39.653	0,6	10.855	12,5	27,4	113.796	1,6	19.630	28,9	17,3	153.449	1,1	30.485	19,7	19,9
Non noto	127	0,0	7	0,0	5,5	108	0,0	2	0,0	1,9	235	0,0	9	0,0	3,8
<b>Totale</b>	<b>6.453.293</b>	<b>48,1</b>	<b>87.108</b>	<b>56,2</b>	<b>1,3</b>	<b>6.974.823</b>	<b>51,9</b>	<b>67.846</b>	<b>43,8</b>	<b>1,0</b>	<b>13.428.135</b>	<b>-</b>	<b>154.954</b>	<b>-</b>	<b>1,2</b>

Nota: La tabella non include i casi per cui non è noto il sesso




**FIGURA 4 - ETÀ MEDIANA DEI CASI DI COVID-19 ALLA DIAGNOSI, AL PRIMO RICOVERO, AL RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA E AL DECESSO IN ITALIA PER SETTIMANA DI DIAGNOSI**

Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è consolidato e verosimilmente sottostimato (vedi Nota metodologica: paragrafo 1)




**FIGURA 5 - TASSO DI INCIDENZA SETTIMANALE CASI SEGNALATI DI COVID-19 PER 100.000 ABITANTI PER FASCIA DI ETÀ A PARTIRE DA OTTOBRE 2021**

Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è consolidato e verosimilmente sottostimato (vedi Nota metodologica: paragrafo 1)




**FIGURA 6 - PERCENTUALE SETTIMANALE CASI DI COVID-19 SEGNALATI IN ITALIA PER STATO CLINICO E PER FASCIA D'ETÀ**

Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è consolidato e verosimilmente sottostimato (vedi Nota metodologica: paragrafo 1)




**FIGURA 7 - TASSO DI RICOVERO SETTIMANALE PER 1.000.000 DI ABITANTI PER FASCIA D'ETÀ DA OTTOBRE 2021**

Nota: Il dato relativo alle ultime due settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato (vedi Nota metodologica: paragrafo 1)




**FIGURA 8 - ANDAMENTO PER MESE DI DIAGNOSI DEL CASE FATALITY RATE (CFR) GREZZO E STANDARDIZZATO PER ETÀ RISPETTO ALLA POPOLAZIONE ITALIANA (2021) E ALLA POPOLAZIONE EUROPEA STANDARD (2013)**



**FIGURA 9 - ANDAMENTO SETTIMANALE DEL NUMERO DI CASI FRA GLI OPERATORI SANITARI E NEL RESTO DELLA POPOLAZIONE DI ETÀ COMPRESA TRA 20-65 ANNI DALL'INIZIO DELLA CAMPAGNA VACCINALE E DOPO L'INIZIO DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA DOSE BOOSTER/AGGIUNTIVA (LINEA NERA TRATTEGGIATA)**

Nota: All'interno dell'area grigia il dato deve essere considerato provvisorio (vedi Nota metodologica; paragrafo 1).






**FIGURA 11 - CONFRONTO TRA IL NUMERO DI CASI DI COVID-19 (PER 100.000 AB.) SEGNALATI IN ITALIA PER REGIONE/PA (PERIODO: 28 FEBBRAIO - 13 MARZO 2022 E 14 - 27 FEBBRAIO 2022)**

*\*Sicilia ha notificato nell'ultima settimana un numero inferiore di casi per problemi tecnico-organizzativi e forte pressione sui servizi sanitari*

**TABELLA 2 - NUMERO ASSOLUTO E TASSO DI INCIDENZA (PER 100.000 AB) DEI CASI DI COVID-19 SEGNALATI IN ITALIA PER REGIONE/PA DALL'INIZIO DELL'EPIDEMIA (TASSO DI INCIDENZA CUMULATIVA) E NEI PERIODI 07 - 13 MARZO 2022 E 28 FEBBRAIO - 13 MARZO 2022**

Regione/PA	Numero di casi totale	Incidenza cumulativa (per 100.000 ab.)	N. Casi tra il 07 - 13 marzo 2022	Tasso di incidenza 7GG (per 100.000 ab.)	N. Casi tra il 28 febbraio - 13 marzo 2022	Tasso di incidenza 14GG (per 100.000 ab.)
Abruzzo	283.216	22.035,77	9.014	701,34	16.118	1.254,07
Basilicata	93.417	17.060,00	4.221	770,85	7.624	1.392,31
Calabria	212.465	11.315,00	13.907	740,63	25.569	1.361,70
Campania	1.271.983	22.395,02	33.440	588,76	57.904	1.019,48
ER	1.223.594	27.524,02	17.296	389,06	31.606	710,96
FVG	281.111	23.450,29	4.467	372,64	8.219	685,63
Lazio	1.189.192	20.787,18	44.628	780,10	71.064	1.242,20
Liguria	353.392	23.406,47	7.663	507,55	13.934	922,90
Lombardia	2.414.085	24.220,80	36.443	365,64	64.726	649,40
Marche	332.434	22.141,51	10.919	727,25	19.540	1.301,45
Molise	42.757	14.418,29	1.821	614,07	3.680	1.240,95
Piemonte	993.349	23.245,97	12.332	288,59	23.564	551,44
PA Bolzano	175.047	32.797,84	3.517	658,97	6.153	1.152,86
PA Trento	144.350	26.498,64	1.993	365,86	3.830	703,08
Puglia	805.882	20.521,93	31.382	799,15	54.917	1.398,47
Sardegna	211.849	13.255,27	11.858	741,95	20.652	1.292,18
Sicilia	823.465	17.010,66	30.984	640,05	59.033	1.219,47
Toscana	940.594	25.640,91	25.436	693,39	44.090	1.201,91
Umbria	212.852	24.606,80	11.555	1.335,82	18.370	2.123,67
VdA	32.131	25.934,06	265	213,89	554	447,15
Veneto	1.390.970	28.665,30	28.313	583,48	51.906	1.069,69
<b>Italia</b>	<b>13.428.135</b>	<b>22.660,63</b>	<b>341.454</b>	<b>576,22</b>	<b>603.053</b>	<b>1.017,68</b>




**FIGURA 12 - TASSO DI INCIDENZA PER 100.000 ABITANTI DI CASI DI COVID-19 SEGNALATI IN ITALIA PER PROVINCIA DI DOMICILIO/RESIDENZA (PERIODO: 28 FEBBRAIO - 13 MARZO 2022)**

*\*Sicilia ha notificato nell'ultima settimana un numero inferiore di casi per problemi tecnico-organizzativi e forte pressione sui servizi sanitari*




**FIGURA 13 - CASI DI COVID-19 SEGNALATI IN ITALIA PER COMUNE DI DOMICILIO/RESIDENZA (PERIODO: 28 FEBBRAIO - 13 MARZO 2022, XXXX COMUNI CON ALMENO UN CASO)**

*\*Sicilia ha notificato nell'ultima settimana un numero inferiore di casi per problemi tecnico-organizzativi e forte pressione sui servizi sanitari*




**FIGURA 14 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER ETÀ E SESSO DEI CASI DI COVID-19 SEGNALATI IN ITALIA (PERIODO: 28 FEBBRAIO - 13 MARZO 2022)**




**FIGURA 15 - VARIAZIONE TASSO DI INCIDENZA A 14 GIORNI PER 100.000 ABITANTI PER FASCIA DI ETÀ (PERIODO: 28 FEBBRAIO - 13 MARZO 2022)**

## Trasmissibilità del virus SARS-Cov-2



**FIGURA 16 - ANDAMENTO GIORNALIERO DI  $R_t$  SINTOMI,  $R_t$  OSPEDALIZZAZIONI E  $R_t$  AUGMENTED NAZIONALE, CALCOLATO IL 16 MARZO 2022**

Nota: Per i dettagli vedi Nota Metodologica paragrafo 2




**FIGURA 17 - STIMA DELL'RT SINTOMI AL 02 MARZO 2022 CALCOLATO IL 16 MARZO 2022**

Nota: Per i dettagli vedi Nota Metodologica paragrafo 2

## Focus età scolare


**TABELLA 3 - DISTRIBUZIONE DEI CASI E DEI DECESSI SEGNALATI NELLA POPOLAZIONE 0-19 ANNI PER FASCIA DI ETÀ, IN ITALIA DALL'INIZIO DELL'EPIDEMIA**

Classe di età (in anni)	N. casi	N. ospedalizzazioni	N. ricoveri in TI	N. deceduti
<5	459.012	7.214	112	15
5-11	1.217.769	3.183	75	15
12-15	678.455	2.066	70	10
16-19	717.284	3.069	98	10
<b>Totale</b>	<b>3.072.520</b>	<b>15.532</b>	<b>355</b>	<b>50</b>




**FIGURA 18 - TASSO DI INCIDENZA SETTIMANALE DI CASI DI COVID-19 SEGNALATI PER DATA DI PRELIEVO/DIAGNOSI NELLA POPOLAZIONE 0-19 PER FASCIA D'ETÀ DA OTTOBRE 2021**

Nota: All'interno dell'area grigia il dato deve essere considerato provvisorio (vedi Nota metodologica: paragrafo 1.)



**FIGURA 19 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE SETTIMANALE DEI CASI COVID-19 PER DATA DI PRELIEVO/DIAGNOSI NELLA POPOLAZIONE 0-19 ANNI PER FASCIA DI ETÀ DA OTTOBRE 2021**


Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è consolidato e verosimilmente sottostimato (vedi Nota metodologica: paragrafo 1)



**FIGURA 20 - TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE SETTIMANALE PER 1.000.000 ABITANTI PER DATA PRELIEVO/DIAGNOSI NELLA POPOLAZIONE 0-19 ANNI PER FASCIA DI ETÀ DA OTTOBRE 2021**

Nota: All'interno dell'area grigia il dato deve essere considerato provvisorio (vedi Nota metodologica: paragrafo 1)


## Reinfezioni da SARS-CoV-2



**FIGURA 21 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE SETTIMANALE DEI CASI DI REINFEZIONE DA SARS-CoV-2 SUL TOTALE DEI CASI SEGNALATI PER DATA DI PRELIEVO/DIAGNOSI A PARTIRE DA OTTOBRE 2021**

Nota:

- Il dato relativo all'ultima settimana non è consolidato e verosimilmente sottostimato (vedi Nota metodologica: paragrafo 1).
- La linea nera tratteggiata al 06/12/2022 rappresenta all'incirca la data di inizio circolazione della variante Omicron in Italia




x\

**FIGURA 22 - RISCHIO RELATIVO AGGIUSTATO DI REINFEZIONE (95% IC) PER LA POPOLAZIONE DI ETÀ ≥12 ANNI A PARTIRE DAL 6/12/2021 RISPETTO AI GIORNI TRASCORSI DALLA PRIMA DIAGNOSI, ALLO STATO VACCINALE, ALLA FASCIA DI ETÀ E ALL'ESSERE O MENO OPERATORE SANITARIO**

Nota:

- Il grafico sono rappresentati i rischi relativi aggiustati derivati dalla stima di un modello lineare generalizzato ad effetti casuali (vedi Nota Metodologica: paragrafo 3).
- Si evidenzia che un valore di rischio relativo (RR) superiore ad 1 indica un aumento del rischio, mentre valori inferiori ad uno indicano una diminuzione del rischio rispetto alla categoria di riferimento identificata dal rombo colorato in rosso (vedi Nota Metodologica: paragrafo 3.3)
- L'asse x (RR) per facilitare il lettore è rappresentata su scala logaritmica
- Per definizione dello stato vaccinale per l'analisi delle reinfezioni vedere Glossario alla voce Reinfezione da SARS-CoV2

## Impatto delle vaccinazioni nel prevenire infezioni, infezioni gravi e decessi



**FIGURA 23 - COPERTURA VACCINALE PERCENTUALE PER FASCIA DI ETÀ, POPOLAZIONE ≥5 ANNI**

Fonte Dati: <https://raw.githubusercontent.com/italia/covid19-opendata-vaccini/master/dati/somministrazioni-vaccini-latest.csv>

**TABELLA 4A - POPOLAZIONE ITALIANA DI ETÀ ≥ 5 ANNI E NUMERO DI CASI DI COVID-19 SEGNALATI PER STATO VACCINALE E CLASSE D'ETÀ**

Gruppo	Fascia di età	Non vaccinati	Vaccinati con ciclo incompleto	Vaccinati con ciclo completo da > 120 giorni	Vaccinati con ciclo completo da ≤120 giorni	Vaccinati con ciclo completo + dose aggiuntiva/booster
<b>Popolazione 26/02/2022</b>	05-11	2.354.072	438.268	0	863.729	0
	12-39	1.882.452	580.048	4.216.911	2.202.049	8.565.450
	40-59	2.005.761	414.831	2.288.245	1.367.385	12.339.889
	60-79	790.275	245.350	820.656	501.955	11.189.776
	80+	155.563	96.224	350.165	92.313	3.904.647
	<b>Totale</b>	<b>7.188.123</b>	<b>1.774.721</b>	<b>7.675.977</b>	<b>5.027.431</b>	<b>35.999.762</b>
<b>Diagnosi tra 11/02/2022- 13/03/2022</b>	05-11	107.862	18.967	0	35.921	0
	12-39	94.480	17.558	87.769	72.815	207.023
	40-59	81.905	11.433	41.822	35.986	228.354
	60-79	29.508	3.894	13.098	8.150	122.764
	80+	6.626	1.082	3.926	1.717	43.901
	<b>Totale</b>	<b>320.381</b>	<b>52.934</b>	<b>146.615</b>	<b>154.589</b>	<b>602.042</b>

Nota: Per maggiori dettagli vedere Nota metodologica paragrafo 4

**TABELLA 4B - POPOLAZIONE ITALIANA DI ETÀ ≥ 5 ANNI E NUMERO DI CASI DI COVID-19 OSPEDALIZZATI E RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA PER STATO VACCINALE E CLASSE D'ETÀ**

Gruppo	Fascia di età	Non vaccinati	Vaccinati con ciclo incompleto	Vaccinati con ciclo completo da > 120 giorni	Vaccinati con ciclo completo da ≤120 giorni	Vaccinati con ciclo completo + dose aggiuntiva/booster
Popolazione 12/02/2022	05-11	2.526.784	670.655	0	458.630	0
	12-39	1.979.011	701.157	5.207.030	2.613.181	6.946.531
	40-59	2.074.199	489.460	3.079.148	1.569.182	11.204.122
	60-79	839.549	293.047	1.276.083	503.669	10.635.664
	80+	170.095	102.423	450.376	85.260	3.790.758
	<b>Totale</b>	<b>7.589.638</b>	<b>2.256.742</b>	<b>10.012.637</b>	<b>5.229.922</b>	<b>32.577.075</b>
Diagnosi tra 28/01/2022- 27/02/2022 con ospedalizzazione	05-11	337	52	0	23	0
	12-39	922	178	578	562	647
	40-59	1.056	152	647	361	1.242
	60-79	2.356	347	1.596	412	3.646
	80+	2.422	353	1.603	296	5.305
	<b>Totale</b>	<b>7.093</b>	<b>1.082</b>	<b>4.424</b>	<b>1.654</b>	<b>10.840</b>
Diagnosi tra 28/01/2022- 27/02/2022 con ricovero in TI	05-11	8	0	0	0	0
	12-39	25	3	12	8	12
	40-59	86	7	34	32	70
	60-79	365	32	130	42	284
	80+	65	12	33	11	140
	<b>Totale</b>	<b>549</b>	<b>54</b>	<b>209</b>	<b>93</b>	<b>506</b>


Nota: Per maggiori dettagli vedere Nota metodologica paragrafo 4

Prodotto dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma, 16 marzo 2022

**TABELLA 4C - POPOLAZIONE ITALIANA DI ETÀ ≥ 12 ANNI E NUMERO DI CASI DI COVID-19 DECEDUTI PER STATO VACCINALE E CLASSE D'ETÀ**

Gruppo	Fascia di età	Non vaccinati	Vaccinati con ciclo incompleto	Vaccinati con ciclo completo da > 120 giorni	Vaccinati con ciclo completo da ≤120 giorni	Vaccinati con ciclo completo + dose aggiuntiva/booster
Popolazione 05/02/2022	05-11	2.666.934	688.094	0	301.041	0
	12-39	2.048.382	734.768	5.884.281	3.020.446	5.759.033
	40-59	2.126.803	491.286	3.942.305	1.738.696	10.117.021
	60-79	879.657	278.521	1.781.675	542.106	10.066.053
	80+	181.063	97.020	540.230	88.216	3.692.383
	<b>Totale</b>	<b>7.902.839</b>	<b>2.289.689</b>	<b>12.148.491</b>	<b>5.690.505</b>	<b>29.634.490</b>
Diagnosi tra 21/01/2022- 20/02/2022 con decesso	05-11	3	0	0	0	0
	12-39	12	1	9	3	6
	40-59	87	12	55	30	53
	60-79	686	79	482	94	532
	80+	1.329	161	943	137	1.765
	<b>Totale</b>	<b>2.117</b>	<b>253</b>	<b>1.489</b>	<b>264</b>	<b>2.356</b>

Nota: Per maggiori dettagli vedere Nota metodologica paragrafo 4



**FIGURA 24 - TASSO DI INCIDENZA CASI COVID-19 SEGNALATI (A), DI OSPEDALIZZAZIONE (B), DI RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA (C) E DI DECESSO (D) PER 100.000 PER STATO VACCINALE E FASCIA DI ETÀ**

Note: Per maggiori dettagli vedere Nota metodologica paragrafo 4  
 - Stime non calcolabili per bassa frequenza di eventi in alcuni strati  
 - Il tasso relativo alla popolazione complessiva ('Totale') equivale al tasso standardizzato rispetto alla popolazione ISTAT 2021 (<https://demo.istat.it/>)

Tabella 5 - Tasso di incidenza casi COVID-19 segnalati, di ospedalizzazione, di ricovero in terapia intensiva e di decesso per 100.000 e rischio relativo per stato vaccinale e fascia di età


Gruppo	Fascia di età	Tasso (per 100,000)				Rischio relativo		
		Non vaccinati	Vaccinati con ciclo completo >120 giorni	Vaccinati con ciclo completo ≤ 120 giorni	Vaccinati con ciclo completo + dose aggiuntiva/booster	Non vaccinati rispetto a vaccinati con ciclo completo >120 giorni	Non vaccinati rispetto a vaccinati con ciclo completo ≤ 120 giorni	Non vaccinati rispetto a vaccinati con ciclo completo + dose aggiuntiva/booster
Diagnosi tra 11/02/2022-13/03/2022	12-39	5.019,0	2.081,4	3.306,7	2.417,0	2,4	1,5	2,1
	40-59	4.083,5	1.827,7	2.631,7	1.850,5	2,2	1,6	2,2
	60-79	3.733,9	1.596,0	1.623,7	1.097,1	2,3	2,3	3,4
	80+	4.259,4	1.121,2	1.860,0	1.124,3	3,8	2,3	3,8
	<b>Totale</b>	<b>4.314,4</b>	<b>1.792,7</b>	<b>2.533,1</b>	<b>1.784,4</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>
Diagnosi tra 28/01/2022-27/02/2022 con ospedalizzazione	12-39	46,6	11,1	21,5	9,3	4,2	2,2	5,0
	40-59	50,9	21,0	23,0	11,1	2,4	2,2	4,6
	60-79	280,6	125,1	81,8	34,3	2,2	3,4	8,2
	80+	1.423,9	355,9	347,2	139,9	4,0	4,1	10,2
	<b>Totale</b>	<b>222,4</b>	<b>72,0</b>	<b>64,5</b>	<b>27,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>8,2</b>
Diagnosi tra 28/01/2022-27/02/2022 con ricovero in TI	12-39	1,3	0,2	0,3	0,2	6,5	4,3	6,5
	40-59	4,1	1,1	2,0	0,6	3,7	2,0	6,8
	60-79	43,5	10,2	8,3	2,7	4,3	5,2	16,1
	80+	38,2	7,3	12,9	3,7	5,2	3,0	10,3
	<b>Totale</b>	<b>15,9</b>	<b>3,6</b>	<b>4,0</b>	<b>1,2</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>13,2</b>
Diagnosi tra 21/01/2022-20/02/2022 con decesso	12-39	0,6	0,2	0,1	0,1	3,0	6,0	6,0
	40-59	4,1	1,4	1,7	0,5	2,9	2,4	8,2
	60-79	78,0	27,1	17,3	5,3	2,9	4,5	14,7
	80+	734,0	174,6	155,3	47,8	4,2	4,7	15,4
	<b>Totale</b>	<b>82,7</b>	<b>22,0</b>	<b>18,0</b>	<b>5,5</b>	<b>3,8</b>	<b>4,6</b>	<b>15,0</b>

\*Stime non calcolabili per bassa frequenza di eventi in alcuni strati

Note: Per maggiori dettagli vedere Nota metodologica paragrafo 4


- Per la fascia d'età 5-11 ancora non è possibile fornire la stima del rischio relativo dato che la vaccinazione di questo gruppo di età è iniziata il 16 dicembre

- Il tasso relativo alla popolazione complessiva ('Totale') equivale al tasso standardizzato rispetto alla popolazione ISTAT 2021



**FIGURA 25 - TASSO DI INCIDENZA SETTIMANALE CASI COVID-19 SEGNALATI PER 100.000 PER STATO VACCINALE E FASCIA DI ETÀ**

Nota: Per maggiori dettagli vedere Nota metodologica paragrafo 4



**FIGURA 26 - TASSO DI INCIDENZA SETTIMANALE MALATTIA SEVERA PER 100.000 PER STATO VACCINALE E FASCIA DI ETÀ**

Nota: Per maggiori dettagli vedere Nota metodologica paragrafo 4

**TABELLA 6 - STIMA EFFICACIA VACCINALE [IC 95%] PERIODO OMICRON PER FASCIA DI ETÀ DAL 2022-01-03**

Gruppo	Fascia di età	Vaccinati con ciclo completo entro 90 giorni	Vaccinati con ciclo completo da 91 - 120 giorni	Vaccinati con ciclo completo da oltre 120 giorni	Vaccinati con ciclo completo + dose aggiuntiva/booster
<b>Diagnosi (2022-01-03/2022-03-13)</b>	12-39	52,4 [52,2-52,6]	41,9 [41,7-42,2]	50,0 [49,8-50,1]	68,9 [68,8-69,0]
	40-59	54,4 [54,1-54,6]	48,7 [48,4-49,0]	46,5 [46,3-46,7]	71,0 [70,9-71,1]
	60-79	66,5 [66,1-67,0]	59,2 [58,6-59,9]	51,5 [51,2-51,8]	80,1 [79,9-80,2]
	80+	69,1 [68,1-70,1]	68,1 [66,7-69,5]	73,6 [73,2-74,0]	82,7 [82,5-82,9]
	<b>Totale</b>	<b>52,0 [51,9-52,2]</b>	<b>42,9 [42,7-43,1]</b>	<b>47,8 [47,7-47,9]</b>	<b>72,0 [72,0-72,1]</b>
<b>Malattia severa (2022-01-03/2022-02-20)</b>	12-39	64,4 [61,6-66,9]	72,6 [70,4-74,7]	80,8 [79,7-81,9]	86,3 [85,2-87,2]
	40-59	70,2 [67,4-72,7]	71,8 [69,0-74,4]	73,4 [72,0-74,7]	85,1 [84,3-85,9]
	60-79	77,6 [75,7-79,4]	78,2 [75,9-80,2]	73,5 [72,6-74,4]	92,1 [91,8-92,4]
	80+	82,1 [80,3-83,7]	82,3 [79,9-84,3]	80,9 [80,2-81,6]	93,9 [93,7-94,1]
	<b>Totale</b>	<b>73,3 [72,2-74,4]</b>	<b>75,8 [74,7-76,9]</b>	<b>76,0 [75,5-76,5]</b>	<b>91,5 [91,3-91,7]</b>

Note:

- Per maggiori dettagli vedere Nota metodologica paragrafo 4.6 - 4.7.

- Per la fascia d'età 5-11 ancora non è possibile fornire la stima dell'efficacia dato che la vaccinazione di questo gruppo di età è iniziata il 16 dicembre

### 1. Differenze tra flusso MdS/PC e flusso ISS

Il numero di eventi riportati nel presente report potrebbe non essere allineato con il numero di eventi riportato nel bollettino quotidiano COVID-19 prodotto dal Ministero della Salute/Protezione Civile (MdS/PC).

Ciò deriva dal fatto che il flusso ISS è più complesso ed articolato rispetto a quello MdS/PC in quanto raccoglie i dati individuali ed è, pertanto, soggetto a un maggior ritardo di notifica dovuto ai tempi necessari alla raccolta e all'inserimento in piattaforma dei casi. I dati vengono aggiornati quotidianamente da ciascuna Regione/PA, ma alcune delle variabili che vengono richieste possono richiedere qualche giorno per la loro rilevazione, il loro inserimento e/o aggiornamento. Per le motivazioni esposte ne consegue, pertanto, che potrebbe non esserci una completa concordanza tra i dati riportati nel presente report e i dati aggregati riportati all'interno del flusso informativo del MdS/PC.

In aggiunta a quanto sopra, occorre infine specificare che il flusso ISS è soggetto a continue modifiche nel tempo a causa del costante aggiornamento dei dati trasmessi da Regioni e PPAA nella piattaforma ISS. Si suggerisce, pertanto, di ritenere come in via di consolidamento i dati relativi almeno all'ultima settimana per le diagnosi, alle ultime due settimane per le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva, e alle ultime tre settimane per i decessi.

Un'ulteriore differenza tra i due flussi è che gli eventi riportati dal bollettino quotidiano MdS/PC sono conteggiati per data di notifica, mentre nel presente report si utilizza la data di prelievo/diagnosi per il calcolo settimanale dei nuovi casi segnalati e la data di evento per i tassi settimanali di ospedalizzazione, ricovero in terapia intensiva e decesso.

### 2. Trasmissibilità del virus SARS-Cov-2

#### 2.1 Rt disponibili e tempestività del dato

L'indice di trasmissibilità  $R_t$  è un parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva.

Ogni settimana vengono calcolati diversi  $R_t$ :

- **$R_t$  sintomi**, basato sulle date di inizio sintomi;
- **$R_{t\text{medio}14\text{gg}}$** , la media degli  $R_t$  di 14 giorni, meno influenzato da variazioni di breve periodo;
- **$R_t$  ospedalizzazioni**, basato sulle date di ricovero e che fornisce quindi un indice di trasmissibilità dei casi più gravi;

- **Rt “augmented”** sui casi sintomatici, basato su una tecnica che permette di fornire una stima più recente rispetto all’Rt sintomi (questa settimana 8 marzo).

Tuttavia, per la scelta della data più recente alla quale si possa considerare sufficientemente stabile ciascuno di questi Rt, bisogna tener conto del consolidamento dei dati. L’acquisizione dei dati epidemiologici relativi alle infezioni è infatti affetta da una serie di ritardi, alcuni dei quali non comprimibili: in particolare, il tempo tra l’evento infettivo e lo sviluppo dei sintomi (tempo di incubazione), quello tra i sintomi e l’esecuzione del tampone, quello tra l’esecuzione del tampone e la conferma di positività, e quello tra la conferma di positività e l’inserimento nel sistema di sorveglianza integrata ISS. Il ritardo complessivo tra infezioni e loro rilevamento nel sistema di sorveglianza è valutato e aggiornato settimanalmente.

Sebbene l’Rt “augmented” sia una stima basata su dati più recenti e quindi più “tempestiva” va tenuto in considerazione che è al tempo stesso potenzialmente meno affidabile in quanto basato su dati ancora non completi e maggiormente dipendente dal ritardo di notifica, che potrebbe essere maggiore in situazioni di alta incidenza.

Per maggiori dettagli sulle modalità di calcolo e sull’interpretazione di questi parametri si rimanda all’approfondimento disponibile sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità: <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/open-data/rt.pdf>

### 3. Reinfezioni da SARS-Cov-2

#### 3.1 Definizione di reinfezione da SARS-CoV-2

In accordo con la nota ministeriale n. 0037911 del 20/08/2021 con oggetto “Flusso dati aggregati Ministero della Salute/Protezione Civile: aggiornamento sulla possibilità di inserimento delle reinfezioni da SARS-CoV-2”, si definisce caso di reinfezione:

- una persona che a seguito di prima infezione da SARS-CoV-2 documentata da test molecolare/antigenico positivo, presenta una seconda infezione documentata da test molecolare/antigenico positivo a distanza di almeno 90 giorni dalla prima diagnosi;
- una persona che a seguito di prima infezione da SARS-CoV-2 documentata da test molecolare positivo, presenta una seconda infezione con test molecolare positivo entro i 90 giorni dalla prima diagnosi purché con ceppo virale di SARS-CoV-2 diverso dal precedente, documentato da genotipizzazione.

#### 3.2 Stima del rischio di reinfezione

Data la definizione di reinfezione, l’analisi del rischio di reinfezione include tutti i casi notificati con una precedente diagnosi di infezione da virus SARS-CoV2 da oltre 90 giorni. L’analisi si focalizza sulle reinfezioni notificate in soggetti con età maggiore o uguale a 12 anni e con data di prelievo/diagnosi a partire dal 6 dicembre 2021, data utilizzata per identificare approssimativamente l’inizio della diffusione della variante

Omicron in Italia<sup>1</sup>. Al fine di stimare il rischio di reinfezione è stato utilizzato il modello lineare generalizzato ad effetti casuali con distribuzione di Binomiale Negativa, considerando il numero di reinfezioni per settimana come variabile dipendente, la regione di residenza come effetto casuale ed includendo le seguenti covariate: giorni dalla prima diagnosi (90-210, >210), stato vaccinale (non vaccinato, vaccinato con almeno una dose da >120 giorni, vaccinato con almeno dose da ≤120 giorni, (vedi glossario sotto la voce Reinfezioni da Sars-CoV-2 per maggiori dettagli), sesso, classe di età decennali (ad esclusione della prima classe che è 12-19), l'essere o meno operatore sanitario, nazionalità (Italiana/Straniera), l'area geografica (Nord, Centro, Sud) e l'incidenza regionale settimanale standardizzata. All'interno del modello è inserita come variabile offset il tempo di osservazione in giorni di ciascun caso nel periodo di analisi.

### 3.3 Interpretazione

Il rischio di reinfezione è rappresentato dal Rischio Relativo (RR) che è il rapporto tra il rischio di osservare una reinfezione in un certo gruppo e il rischio in un altro gruppo. In generale, la classe di riferimento di ogni variabile è individuata dal rombo di colore rosso in cui infatti si osserva un RR pari a 1 (vedere **Figura 22**). Valori del RR superiori ad 1 identificano un aumento del rischio di reinfezione rispetto alla classe di riferimento mentre valori inferiori ad 1 individuano una diminuzione del rischio. Ad esempio, un RR pari a 1,8 in corrispondenza della classe >210 della variabile giorni dalla prima diagnosi indica un rischio di reinfezione 1,8 volte maggiore (80% maggiore) per chi ha avuto la prima diagnosi di SARS-CoV-2 da oltre 210 giorni rispetto a chi l'ha avuta fra 90 ed i 210 giorni.

## 4. Impatto delle vaccinazioni nel prevenire nuove infezioni, infezioni gravi e decessi

I dati di impatto delle vaccinazioni sono ricavati da un'analisi congiunta dei dati contenuti nell'Anagrafe Vaccinale Nazionale e di quelli contenuti nel database della Sorveglianza Integrata COVID-19. Tale attività è resa possibile dal Decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2, che disciplina i sistemi informativi funzionali all'implementazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2.

### 4.1 Numero eventi per stato vaccinale

Per l'analisi dell'impatto delle vaccinazioni si utilizza sempre la data prelievo/diagnosi per calcolare il numero di casi segnalati nel corso del periodo di riferimento che hanno avuto come esito l'ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva o il decesso.

### 4.2 La popolazione di riferimento

---

<sup>1</sup> Stefanelli, P., Trentini, F., Petrone, D., Mammone, A., Ambrosio, L., Manica, M., ... & Merler, S. (2022). Tracking the progressive spread of the SARS-CoV-2 Omicron variant in Italy, December 2021-January 2022. *medRxiv*.

La popolazione di riferimento utilizzata corrisponde alla popolazione vaccinabile per Regione/PA e fascia di età resa disponibile al seguente link <https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini> dalla Struttura Commissariale per l'Emergenza Covid-19. Si evidenzia che tale popolazione è dinamica in quanto l'età della popolazione viene costantemente aggiornata dalla struttura commissariale: i soggetti nel tempo cambiano classe d'età portando con sé il proprio stato vaccinale. In aggiunta, lievi oscillazioni dei dati, sono da considerarsi fisiologiche in database che contengono milioni di dati individuali e sono attribuibili a consolidamento e pulizia dei dati e, talvolta, ad aggiornamenti tardivi da parte degli utenti.

#### **4.3 Perché si usano differenti periodi di riferimento fra diagnosi, ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi?**

In **Tabella 5A**, **Tabella 5B** e **Tabella 5c** sono riportati rispettivamente il numero di diagnosi di COVID-19, il numero di diagnosi con ospedalizzazione o ricovero in terapia intensiva e il numero di diagnosi che hanno avuto come esito il decesso. I periodi di riferimento per le diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 e per le ospedalizzazioni, i ricoveri in TI e i decessi sono differenti tra loro, in quanto tengono in considerazione il ritardo di notifica dei dati e il tempo necessario per valutare l'evoluzione della malattia a seguito della sua diagnosi. Si considera quindi un ritardo medio stimato di due settimane per ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva (calcolato a partire dalla domenica precedente alla data di analisi, 16/3/2022) e di tre settimane per i decessi.

Per una lettura più corretta del dato, all'interno di ciascuna tabella è riportata la popolazione di riferimento che equivale alla popolazione presente a metà del periodo preso in considerazione per ciascun "esito".

#### **4.4 Effetto paradosso**

È noto che, quando le coperture vaccinali nella popolazione sono elevate, si verifica il cosiddetto "effetto paradosso" per cui il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni e decessi può essere simile, se non maggiore, tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati, per via della progressiva diminuzione nella numerosità di quest'ultimo gruppo ([https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset\\_publisher/yJS4xO2fauqM/content/vaccinati-e-non-il-confronto-tra-i-casi-ci-dice-che-il-vaccino-funziona](https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/vaccinati-e-non-il-confronto-tra-i-casi-ci-dice-che-il-vaccino-funziona)).

#### **4.5 Calcolo e interpretazione dei tassi per stato vaccinale**

In **Tabella 6** e nelle **Figure 23, 24 e 25** sono riportati i tassi specifici per età di incidenza, di ospedalizzazione, di ricovero in terapia intensiva e di decesso per stato vaccinale. Inoltre, è riportato per la popolazione complessiva ("Totale") il tasso di incidenza, di ospedalizzazione, di ricovero in terapia intensiva e di decesso standardizzato rispetto alla struttura per età della popolazione di riferimento (Istat, al 1 gennaio 2021, <https://demo.istat.it/>).

L'utilizzo dei tassi è fondamentale in quanto considerare solo il numero assoluto di eventi in uno specifico gruppo (ad es. completamente vaccinati, non vaccinati, ecc.), anche all'interno della stessa fascia di età, senza riferimento al numero di persone che in quello stesso periodo appartenevano a quello specifico gruppo, può dare informazioni fuorvianti. Per rendere possibile il confronto è quindi necessario calcolare i tassi di incidenza, di ospedalizzazione, di ricovero in terapia intensiva e di decesso che rappresentano la proporzione di nuovi eventi che si verificano in una popolazione in un dato lasso di tempo. All'interno di ciascuna fascia di età è necessario calcolare il tasso specifico per età, ovvero il numero di eventi in ciascuna fascia d'età diviso la popolazione di ciascuna fascia d'età nel periodo di riferimento (per 100.000). Infine, per stimare correttamente il tasso nella popolazione complessiva di età pari o superiore a 12 anni ('Totale') è stato utilizzato il tasso standardizzato con metodo diretto, calcolato come la media dei tassi specifici per età pesata utilizzando la struttura per età della popolazione Italiana come riferimento standard (fonte dati di popolazione, ISTAT al 1 gennaio 2021). In questo modo è stato possibile eliminare la distorsione nel confronto tra i vari gruppi esaminati (ad es. completamente vaccinati, non vaccinati, ecc.) dovuta alla loro differente distribuzione per età.

#### **4.6 Calcolo e interpretazione dell'efficacia vaccinale**

L'efficacia del vaccino è stimata usando il modello lineare generalizzato ad effetti casuali con distribuzione di Poisson, considerando il numero di eventi per giorno come variabile dipendente, lo stato vaccinale come variabile indipendente, le fasce di età decennali e l'incidenza regionale settimanale come variabili di aggiustamento e includendo la regione di somministrazione come effetto casuale. All'interno del modello è inserita come variabile offset il numero giornaliero di persone esposte per stato vaccinale, fascia anagrafica e Regione/PA. Il numero giornaliero di persone esposte è calcolato al netto dei soggetti con pregressa diagnosi nei 90 giorni precedenti come da definizione di reinfezione. Attraverso questo modello è possibile stimare il rischio relativo (RR), ossia il rapporto fra l'incidenza dell'evento tra i vaccinati completi (< 90 giorni, 91-120 giorni e >120 giorni e booster/dose aggiuntiva) e l'incidenza dello stesso evento tra i non vaccinati. Le stime di efficacia vaccinale in termini percentuali sono calcolate sulla base degli RR come  $(1-RR)*100$ . Più il valore è vicino a 100 e più alta è l'efficacia vaccinale (100 valore massimo possibile).

L'efficacia vaccinale misura quindi la riduzione percentuale del rischio di osservare un certo evento tra le persone vaccinate con ciclo completo rispetto alle persone non vaccinate. Una stima dell'efficacia del vaccino pari al 90% indica una riduzione del 90% della probabilità di insorgenza della malattia nel gruppo vaccinato. Siccome le stime riportate sono basate su un modello statistico, ciascuna stima ha un livello di incertezza espresso dall'intervallo di confidenza, il quale indica che verosimilmente (con il 95% di probabilità) il valore reale dell'efficacia è compreso tra i valori riportati nell'intervallo stesso.

#### **4.7 Limiti delle stime di efficacia vaccinale**

È necessario evidenziare che le stime di efficacia riportate non prendono in considerazione diversi fattori che potrebbero influire sul rischio di

infezione/ricovero/morte e sulla probabilità di essere vaccinato da un periodo più o meno lungo. Infatti, la campagna vaccinale inizialmente ha coinvolto la popolazione più a rischio (operatori sanitari, residenti nelle RSA, persone con più di 80 anni e persone estremamente vulnerabili) e solo successivamente è stata aperta al resto della popolazione.

Le stime di efficacia relative alle fasce di età con un'alta copertura vaccinale potrebbero risentire di un maggiore sbilanciamento nella distribuzione della popolazione fra vaccinati e non vaccinati. Quest'ultimi attualmente rappresentano una fetta molto piccola della popolazione, caratterizzata verosimilmente da fattori di rischio differenti per i quali non è possibile aggiustare all'interno dei modelli per mancanza di adeguate informazioni a livello individuale (es: aspetti socio-comportamentali).

**Caso:** attualmente la definizione di caso si basa sulla Circolare del Ministero della Salute "Definizione di caso" pubblicata il 9 Marzo 2020 (disponibile al seguente link:

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73669&parte=1%20&serie=null>) e aggiornata l'8 gennaio 2021 con la pubblicazione della Circolare del Ministero della Salute "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing" (disponibile al seguente link: <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78155&parte=1%20&serie=null>)

**Casi non vaccinati:** tutti i casi notificati con una diagnosi confermata di infezione da virus SARS-CoV-2 che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, oppure sono stati vaccinati con prima dose o con vaccino monodose nei 14 giorni precedenti la diagnosi stessa, ovvero che abbiano contratto l'infezione prima del tempo necessario per sviluppare una risposta immunitaria almeno parziale al vaccino.

**Casi con ciclo incompleto di vaccinazione:** tutti i casi notificati con una diagnosi confermata di infezione da virus SARS-CoV-2

- avvenuta almeno 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose, in soggetti che hanno ricevuto un vaccino che prevede un ciclo vaccinale a due dosi (vaccini Pfizer-BioNtech, Moderna e Vaxzevria);
- avvenuta entro 14 giorni dalla somministrazione della seconda dose. Si ricorda che un ciclo di vaccinazione incompleto fornisce una protezione inferiore rispetto ad un ciclo di vaccinazione completo.

**Casi con ciclo completo di vaccinazione:** tutti i casi notificati con una diagnosi confermata di infezione da virus SARS-CoV2 dopo almeno 14 giorni dal completamento del ciclo vaccinale (14 giorni dalla somministrazione della seconda dose per i vaccini Pfizer-BioNtech, Moderna e Vaxzevria o 14 giorni dalla somministrazione dell'unica dose per il vaccino Janssen/Johnson&Johnson).

**Casi con ciclo completo di vaccinazione effettuato da meno di 90 giorni:** tutti i soggetti notificati con una diagnosi confermata di infezione da virus SARS-CoV2 documentata a partire dal quattordicesimo giorno dopo il completamento del ciclo vaccinale e per i successivi 90 giorni.

**Casi con ciclo completo di vaccinazione effettuato fra i 91 e i 120 giorni:** tutti i soggetti notificati con una diagnosi confermata di infezione da virus SARS-CoV2 effettuata fra i 91 e i 120 giorni dopo il quattordicesimo giorno successivo al completamento del ciclo vaccinale.

**Casi con ciclo completo di vaccinazione effettuato da ≤ 120 giorni:** tutti i soggetti notificati con una diagnosi confermata di infezione da virus SARS-CoV2 documentata a partire dal quattordicesimo giorno dopo il completamento del ciclo vaccinale e per i successivi 120 giorni.

**Casi con ciclo completo di vaccinazione da oltre 120 giorni:** tutti i soggetti notificati con una diagnosi confermata di infezione da virus SARS-CoV2 effettuata più di

120 giorni dopo il quattordicesimo giorno successivo al completamento del ciclo vaccinale che non hanno ricevuto la dose aggiuntiva/booster nei 14 giorni precedenti.

**Casi con ciclo completo di vaccinazione più dose aggiuntiva/booster:** tutti i soggetti notificati con una diagnosi confermata di infezione da virus SARS-CoV2 documentata almeno 14 giorni dopo la somministrazione della dose aggiuntiva o booster.

**Decesso:** decesso risultante da una malattia clinicamente compatibile in un caso probabile o confermato di COVID-19, a meno che non vi sia una chiara causa di morte alternativa non correlabile al COVID-19 (per esempio, trauma).

**Efficacia vaccinale:** misura la riduzione proporzionale dei casi tra le persone vaccinate. L'efficacia del vaccino è stimata calcolando il rischio di malattia fra le persone vaccinate e non vaccinate. Il complemento ad 1 del rapporto fra queste due misure equivale alla riduzione percentuale del rischio di malattia tra le persone vaccinate rispetto alle persone non vaccinate. Maggiore è la riduzione percentuale della malattia nel gruppo vaccinato, maggiore è l'efficacia del vaccino. Una stima dell'efficacia del vaccino pari al 90% indica una riduzione del 90% dell'insorgenza della malattia nel gruppo vaccinato, ovvero una riduzione del 90% rispetto al numero di casi attesi se non fossero stati vaccinati.

**Età mediana:** misura della tendenza centrale che indica l'età che divide la popolazione ordinata rispetto all'età stessa in due gruppi numericamente uguali.

**Intervallo di confidenza:** insieme di valori che verosimilmente include il valore reale della popolazione con un certo grado di confidenza. L'intervallo di confidenza al 95% indica l'intervallo di valori che contiene il valore reale della popolazione con probabilità pari al 95%.

**Letalità:** il numero di persone che sono morte a causa della malattia diviso per il numero totale di persone ammalate di quella malattia.

**Malattia severa:** condizione clinica di soggetti con storia di ricovero (in terapia intensiva e non) o deceduti.

**Mortalità:** il numero di persone che sono morte a causa della malattia diviso per la popolazione totale.

**Reinfezione da SARS-CoV2:** La nota ministeriale n. 0037911 del 20/08/2021 con oggetto "Flusso dati aggregati Ministero della Salute/Protezione Civile: aggiornamento sulla possibilità di inserimento delle reinfezioni da SARS-CoV-2" definisce caso di reinfezione:

- una persona che a seguito di prima infezione da SARS-CoV-2 documentata da test molecolare/antigenico positivo, presenta una seconda infezione documentata da test molecolare/antigenico positivo a distanza di almeno 90 giorni dalla prima diagnosi;
- una persona che a seguito di prima infezione da SARS-CoV-2 documentata da test molecolare positivo, presenta una seconda infezione con test molecolare positivo entro i 90 giorni dalla prima diagnosi purché con ceppo virale di SARS-CoV-2 diverso dal precedente, documentato da genotipizzazione.

*Prodotto dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma, 16 marzo 2022*

Ai fini delle analisi delle reinfezioni in base allo stato vaccinale vengono utilizzate le seguenti definizioni:

- Non vaccinati, ovvero i soggetti che non hanno ricevuto alcuna dose o hanno ricevuto la prima dose o una dose di vaccino mono dose meno di 14 giorni prima della reinfezione o che hanno ricevuto la prima dose dopo la reinfezione.
- Almeno una dose entro 120 giorni ovvero i soggetti che risultavano vaccinati a partire dal quattordicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose, o della seconda dose/monodose o della dose booster/aggiuntiva e per i successivi 120 giorni.
- Almeno una dose da oltre 120 giorni ovvero i soggetti che risultavano aver ricevuto la prima dose, o la seconda dose/monodose o la dose booster/aggiuntiva da oltre 120 giorni.

**Rischio Relativo:** confronta il rischio di osservare un certo evento (per esempio un'infezione, un ricovero in ospedale dovuto ad una malattia o un decesso) in un gruppo con il rischio di osservare lo stesso evento in un altro gruppo.

**Stato clinico asintomatico:** assenza di segni o sintomi apparenti di malattia in persona positiva al test per SARS-CoV-2.

**Stato clinico critico:** chiari segni e sintomi di malattia (ad esempio, malattia respiratoria) e abbastanza gravi da richiedere il ricovero in Terapia Intensiva, riscontrati in una persona positiva al test per SARS-CoV-2.

**Stato clinico lieve:** chiari segni e sintomi di malattia (malattia respiratoria) ma non abbastanza gravi da richiedere il ricovero ospedaliero, riscontrati in una persona positiva al test per SARS-CoV-2.

**Stato clinico pauci sintomatico:** con sintomi lievi (ad esempio malessere generale, lieve rialzo della temperatura corporea, stanchezza, ecc.) riscontrati in persona positiva al test per SARS-CoV-2.

**Stato clinico severo:** chiari segni e sintomi di malattia (malattia respiratoria) abbastanza gravi da richiedere il ricovero ospedaliero, riscontrati in una persona positiva al test per SARS-CoV-2.

**Tasso di incidenza:** proporzione di nuove diagnosi che si verificano in una popolazione in un dato lasso di tempo.

**Tasso di ricovero:** proporzione di nuove ospedalizzazioni che si verificano in una popolazione in un dato lasso di tempo.

**Tasso di incidenza specifica per età:** proporzione di nuove diagnosi che si verificano in una popolazione in una fascia di età predeterminata in un dato lasso di tempo.

**Tasso di incidenza standardizzata:** media ponderata dei tassi specifici per età utilizzando come pesi la struttura per classe di età della popolazione standard (popolazione ISTAT 2021).

**Prodotto dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma**

A cura di: Martina Del Manso, Chiara Sacco, Flavia Riccardo, Antonino Bella, Alberto Mateo Urdiales, Massimo Fabiani, Stefano Boros, Fortunato (Paolo) D'Ancona, Maria Cristina Rota, Antonietta Filia, Matteo Spuri, Sara Antignani, Marco Bressi, Maria Fenicia Vescio, Daniele Petrone, Corrado Di Benedetto, Marco Tallon, Alessandra Ciervo, Paola Stefanelli, Patrizio Pezzotti per ISS;

Giorgio Guzzetta, Valentina Marziano, Piero Poletti, Filippo Trentini, Marco Ajelli, Stefano Merler per Fondazione Bruno Kessler;

e di: Antonia Petrucci (Abruzzo); Michele La Bianca (Basilicata); Anna Domenica Mignuoli (Calabria); Pietro Buono (Campania); Erika Massimiliani (Emilia-Romagna); Fabio Barbone (Friuli Venezia Giulia); Francesco Vairo (Lazio); Camilla Sticchi (Liguria); Danilo Cereda (Lombardia); Marco Pompili (Marche); Raffaele Malatesta (Molise); Annamaria Bassot (P.A. Bolzano); Pier Paolo Benetollo (P.A. Trento); Chiara Pasqualini (Piemonte); Lucia Bisceglia (Puglia); Maria Antonietta Palmas (Sardegna); Sebastiano Pollina (Sicilia); Emanuela Balocchini (Toscana); Anna Tosti (Umbria); Mauro Ruffier (Valle D'Aosta); Filippo Da Re (Veneto).

Citare il documento come segue: Task force COVID-19 del Dipartimento Malattie Infettive e Servizio di Informatica, Istituto Superiore di Sanità. Epidemia COVID-19.

Aggiornamento nazionale: 16 marzo 2022